



Black seedless (par erreur)

Vass3R07s306-310



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp129

0Mtp129  
3R7 + 306-310  
Black Seedless

0

SP


0Mtp129

Black seedless (par erreur)

Vass3R07s306-310











N° d'ordre :  
Désignation : *Black needles*  
Emplacement : 3A7 A 306.310

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (182) - moyen 183 - globuleux 184.  
Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux (188) - duveteux 189 -  
cotonneux 190 - sans villosité pubescente (278) - sans villosité  
laineuse 279.  
Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -  
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - ~~entièrement~~ bronzé  
ou cuivré 197 - vert (198).

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.  
Face inférieure : glabres (199) - sétueuses 200 - veloutées 201 -  
aranéuses (202) - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité  
pubescente (280) - sans villosité laineuse 281.  
Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -  
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -  
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes (212) - autres 213.  
(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre (214) - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux (217) -  
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente (282) -  
sans villosité laineuse 283.  
Limbe : glabre (220) - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -  
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente (284) -  
sans villosité laineuse (285).  
A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -  
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou  
cuivrées 232 - verte (233).  
A pétiole glabre (234) - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 -  
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente (286) - sans  
villosité laineuse (287).  
Totalemant - sillon - partiellement.



N° d'ordre :  
Désignation : *Black seedless*.  
Emplacement : *3 R 7 A.306.310.*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour *uni* - anguleux - *côtelé*.  
Glabre *242* - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -  
sèteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.  
sans villosité pubescente *288* - sans villosité laineuse *289*.  
*Entièrement* - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - *vert* 250.  
                  ventre coloré 251 - à raies 252 - *vert* 253.  
Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - *vert* 256.  
                  ventre coloré 257 - à raies 258 - *vert* 259.  
Vrille : *verte* 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.  
                  *subcontinues* - *intermittentes*.  
                  *très courte* - courte - *moyenne* - longue - *très longue*.  
Bourgeon : coloré 264 - *vert* 265.

( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - *moyen* - petit.  
Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite *6*.

**Formulaire de description 6/8**  
(après chute des feuilles)

Année 1999

Observateur

Code cépage

Code clone

Nom cépage Black seedles

Emplacement : 3 R7A306-340

Sarment

13 ≠ ?? à vérifier

oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 **lenticelles** : absentes 1 - présentes 9

oiv 105 **densité des poils dressés des noeuds** : absence 1 - présence 9

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenoeuds** : absence 1 - présence 9

oiv 353 **longueur entrenoeuds** : très courts (< 60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9

oiv 354 **diamètre entrenoeuds** : très petit (< 5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

Vassal

Noeuds : aplatis 1 - moyens 3 - saillants 5

prime 3

vigueur 3